

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐA QUYN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: /UBND
V/v phòng trừ bệnh Thán
thur, hiện tượng vàng lá rụng trái
trên cây cà phê

Đa Quyn, ngày tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Ban nhân dân các thôn.

Thực hiện văn bản số 139 TB/TTNN ngày 26/7/2024 của Trung Tâm Nông Nghiệp huyện Đức Trọng “V/v phòng trừ bệnh Thán thur, hiện tượng vàng lá rụng trái trên cây cà phê.”

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổng diện tích cà phê toàn xã khoảng 1243 ha, hiện đang ở giai đoạn trái non. Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn xã hiện tượng rụng trái non xuất hiện rải rác các thôn trên địa bàn xã, gây hại ở mức nhẹ.

Diễn biến thời tiết theo chiều hướng trời âm u- thiếu ánh sáng, mưa nhiều, ẩm độ không khí cao như hiện nay là điều kiện thuận lợi để bệnh thán thur, hiện tượng rụng trái non phát triển, gây hại mạnh. Để chủ động quản lý bệnh thán thur, hiện tượng rụng trái non nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đến năng suất cà phê năm 2024, UBND xã Đa Quyn đề nghị Ban nhân dân các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:

- Biện pháp canh tác:

+ Cắt tỉa bớt cây che bóng trong vườn đảm bảo vườn luôn thông thoáng, không bị thiếu nắng, hạn chế nấm bệnh phát triển.

+ Tỉa chồi vượt, cành khô, già cỗi, cành bị sâu bệnh, những cành nằm sâu trong tán lá không có quả, tạo cho vườn cây thông thoáng, cây sinh trưởng, phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh, hạn chế sự lây lan của các loại bệnh gây rụng trái.

+ Vệ sinh đồng ruộng: Quản lý cỏ dại thật tốt, tránh hiện tượng cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng. Lưu ý bà con nên hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ, ưu tiên quản lý cỏ bằng biện pháp cơ giới – dùng máy phát cỏ phát cao cách mặt đất 3- 5cm.

- Bón phân cân đối, hợp lý:

+ Vườn cà phê đang ở giai đoạn nuôi trái mà bón phân không đầy đủ hoặc thiếu cân đối đều gây nên hiện tượng rụng trái non. Bà con cần bổ sung ngay phân bón NPK (16-16-8; 16-8-18; 20-10-20...) lượng từ 700-1000kg/ha chia làm 2 đợt cách nhau 15-20 ngày tùy theo mức độ thiếu dinh dưỡng của vườn cây. Ngoài ra cần bổ sung các nguyên tố trung vi lượng hợp lý như Mg, Ca, Bo, Zn...

+ Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma phối trộn phân hữu cơ vi sinh để bón cho cây cà phê.

- Biện pháp hóa học:

Đối với bệnh khô cành, khô quả, thán thư/cây cà phê: Khi phát hiện cây bị bệnh luân phiên sử dụng các hoạt chất như Copper Hydroxide(DuPont Kocide 46,1WG); Mancozeb(Dithane M-4580WP);Hexaconazole(Tungvil 5SC); Prochloraz(Talent 50WP); Azoxystrobin+ Difenconazole(Amistar top 325SC); Hexaconazole + Tricyclazole(Forvilnew 250SC) để phòng trừ. Trong trường hợp mưa liên tục, phải phun kép từ 2 –3 lần cách nhau 5-7 ngày, khi phun thuốc phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

Trên đây là khuyến cáo của UBND xã Đa Quyn v/v phòng trừ bệnh Thán thư, hiện tượng vàng lá rụng trái trên cây cà phê.

Nơi nhận:

- ĐU-HĐND xã;
- CT, các PCT.UBND xã;
- KN-TY xã;
- BND 6 thôn;
- Cán bộ Đài TT thanh xã;
- Lưu: VT, KN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Thị Kim Oanh