

Số: /TB-UBND

Đa Quyn, ngày 01 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v triển khai các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 2657/UBND-VP, ngày 30 tháng 10 năm 2024 của phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Đa Quyn về phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 trên địa bàn xã Đa Quyn.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, qua rà soát và nắm tình hình tại địa phương, hiện nay trên địa bàn xã Đa Quyn chưa phát hiện dịch tả lợn châu phi.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, UBND xã Đa Quyn yêu cầu nhân viên nhân viên Thú y, Ban nhân dân các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai, hướng dẫn nhân dân thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân áp dụng nghiêm các biện pháp an toàn trong chăn nuôi và chủ động tích cực phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn trong phòng chống dịch bệnh, khi phát hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cần cách ly, chăm sóc tốt đồng thời khai báo ngay với chính quyền địa phương hoặc thú y viên để xử lý kịp thời.

2. Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, trên địa bàn để sớm khoanh vùng, khống chế, dập dịch hiệu quả khi có ổ dịch xuất hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo, bán chạy gia súc, gia cầm bệnh chết hoặc vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

3. Quản lý chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ để hạn chế dịch bệnh lây lan qua khâu vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật. Khi phát hiện gia súc mắc bệnh phải báo ngay cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời tránh tình trạng dịch bệnh lây lan.

4. Tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện tốt một số biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi khi nhiệt độ ngoài trời thấp, gia cố

chuồng trại đảm bảo ẩm, khô ráo tránh mưa tạt, gió lùa, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống.

5. Tổ chức thực hiện công tác phun xịt tập trung và cấp phát thuốc sát trùng chuồng trại để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Yêu cầu Ban nhân dân các thôn triển khai thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy - HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- HND, KN xã;
- Trạm TT xã; (đọc TB)
- BND 6 thôn;
- Lưu VT LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Kim Oanh

CÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

(Kèm theo thông báo số ... /TB-UBND ngày .../11/2024 của UBND xã Đa Quyn)

1. Đặc điểm chung của Dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi (tên tiếng Anh là African swine fever – ASF) là bệnh truyền nhiễm xảy ra do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài lợn và lợn hoang dã; bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Vi rút gây ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi (ASFV) có sức đề kháng cao trong môi trường. Lợn khỏi bệnh có khả năng mang vi rút trong thời gian dài, có thể là vật chủ mang trùng suốt đời, do vậy khó có thể loại trừ được bệnh nếu để xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

2. Đặc điểm của vi rút Dịch tả lợn châu Phi

Vi rút Dịch tả lợn châu Phi là vi rút có gen di truyền dạng ADN, có vỏ bọc dạng Icoahedral, kích thước lớn, là Irido – vi rút và xếp vào họ Irido – virus và xếp vào họ Iridoviridae nhưng sau đó được phân loại vào chi mới chuyên biệt là chi Genus Asfi – vi rút thuộc họ Asfarviridae. Vi rút có 1 serotype, nhưng phát hiện có tới 16 gentotypes và nhiều chủng khác nhau có độc lực khác nhau.

Vi rút Dịch tả lợn châu Phi được tìm thấy trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh và chết bởi bệnh này. Lợn sau khi khỏi bệnh sẽ ở thể miễn tính có thể mang vi rút suốt đời. Ngoài ra, ve mềm thuộc chi Ornithodoros là một vector sinh học trong tự nhiên.

Vi rút Dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại trong chất tiết, dịch tiết, trong xác động vật, trong thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn như xúc xích, dăm bông, salami. Vi rút có khả năng chịu được nhiệt độ thấp, đặc biệt là trong các sản phẩm thịt lợn sống hoặc nấu ở nhiệt độ không cao nên vi rút có thể chịu được trong thời gian dài từ 3 – 6 tháng; vi rút có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56° C trong 70 phút hoặc 60°C trong 20 phút. Vi rút sống trong máu đã phân hủy được 15 tuần; trong máu khô không được 70 ngày; trong phân ở nhiệt độ phòng được 11 ngày; trong máu lợn ở nhiệt độ 4 °C trong 18 tháng; trong thịt dính xương ở nhiệt độ 39 °C trong 150 ngày; trong giăm bông được 140 ngày và ở nhiệt độ 50°C tồn tại trong 3 giờ.

Trong môi trường không có huyết thanh, vi rút có thể bị phá hủy ở pH<3,9 hoặc pH>11,5. Môi trường huyết thanh vi rút có thể tồn tại được ở pH=13,4 trong 7 ngày; không có vi rút huyết thanh vi rút có thể sống được 21 giờ.

Hóa chất để diệt vi rút Dịch tả lợn châu Phi bao gồm: ether, chloroform và hợp chất iodine hoặc sử dụng Sodium hydroxide với tỉ lệ 8/1.000 hoặc formalin với tỉ lệ

3/1.000 hoặc chất tẩy trắng hypochlorite chứa chlorine 2,3% hoặc orhotho-phenylphenol 3% nhưng phải duy trì thời gian 30 phút.

3. Quá trình gây bệnh và lây lan vi rút Dịch tả lợn châu Phi

– Bệnh dịch tả lợn châu Phi có thời gian ủ bệnh từ 3-15 ngày, ở thể cấp tính thời gian ủ bệnh từ 3-4 ngày.

– Vi rút Dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm vi rút như: chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm vi rút và thức ăn thừa chứa thịt lợn nhiễm bệnh hoặc bị ve mềm cắn.

Bà con nông dân khi phát hiện lợn có biểu hiện nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.